

	PROTOCOLO PARA MANIPULACIÓN DE MEDICAMENTOS DE SEDACIÓN PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN EN LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA	Código: SUH-MD-PR-06 Versión: 01 Fecha: 30/05/2024
---	---	--

Pautas de manipulación de medicamentos de sedación para prevenir la contaminación en la unidad de gastroenterología

Introducción

Los medicamentos de sedación contaminados pueden plantear graves riesgos para la seguridad del paciente. Este documento describe las directrices esenciales para prevenir la contaminación durante la administración de medicamentos sedantes en la unidad de gastroenterología.

Objetivo

- Estandarizar los procesos al momento de la aplicación de medicamentos por parte de los profesionales especialistas en anestesiología evitando condiciones inseguras y minimizando la probabilidad de ocurrencias de eventos adversos con medicamentos.

Alcance

Este protocolo se aplica para todas las salas de procedimientos de las unidades de gastroenterología de La Carolina Medical IPS incluidas las unidades externas (Compensar)

Responsable

Médicos especialistas en anestesiología

Manejo de medicamentos en las unidades de Gastroenterología

Preparación

- Realice una higiene de manos minuciosa con agua y jabón o desinfectante de manos antes de manipular medicamentos de sedación.
- Utilice guantes limpios y no estériles para manipular viales de medicación, jeringas y equipos relacionados.
- Absténgase de utilizar medicamentos que presenten decoloración, partículas o signos de deterioro.

Manipulación de la medicación

Desinfectar todas las superficies que vayan a entrar en contacto con viales de medicación, jeringas u otros equipos.

Siga técnicas asépticas al extraer los medicamentos de los viales y preparar las jeringas.

- Prepare las inyecciones utilizando una técnica aséptica en una zona limpia, prepare medicamento por procedimiento. (no preparar medicamento para toda la jornada)

	PROTOCOLO PARA MANIPULACIÓN DE MEDICAMENTOS DE SEDACIÓN PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN EN LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA	Código: SUH-MD-PR-06 Versión: 01 Fecha: 30/05/2024
---	---	--

- Desinfecte el tabique de goma de un vial de medicación con alcohol antes de la perforación.
- No utilice agujas o jeringas para más de un paciente
- Los envases de medicamentos (viales monodosis y multidosis, ampollas y bolsas) se introducen con una nueva aguja y una nueva jeringa, incluso cuando se extraen dosis adicionales para el mismo paciente.
- Utilizar viales monodosis para medicamentos parenterales siempre que sea posible.
- No combine el contenido sobrante de viales de un solo uso para su uso posterior.
- En caso de utilizar viales multidosis, se aplicará lo siguiente:
- Dedicar los viales multidosis a un solo paciente siempre que sea posible.
- Si se van a utilizar viales multidosis para más de un paciente, deben restringirse a un área centralizada de medicación y no deben entrar en el área inmediata de tratamiento del paciente para evitar la contaminación inadvertida.
- Fechar los viales multidosis cuando se abran por primera vez y desecharlos en un plazo de 24 horas.
- Propofol debe desecharse después de 12 horas.
- No utilice equipos de infusión o administración de fluidos (por ejemplo, bolsas intravenosas, tubos, conexiones) para más de un paciente.

Principio de uso único

Utilice viales monodosis para cada paciente a fin de evitar la contaminación cruzada.

Evite mezclar la medicación de viales monodosis para varios pacientes

Etiquetado

Etiquetar correctamente las jeringas y los envases con la información del paciente (nombre, cédula) y los detalles de la medicación para evitar errores.

Administración

Designe un espacio de trabajo limpio y exclusivo para la preparación y administración de la medicación.

No vuelva a tapar las agujas o jeringuillas después de usarlas para evitar pinchazos

Eliminación de residuos

Deseche las agujas, jeringas y objetos punzantes usados en los contenedores designados.

	PROTOCOLO PARA MANIPULACIÓN DE MEDICAMENTOS DE SEDACIÓN PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN EN LA UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA	Código: SUH-MD-PR-06 Versión: 01 Fecha: 30/05/2024
---	---	--

Asegúrese de que se siguen los procedimientos adecuados de eliminación de objetos punzantes.

Equipo de protección personal (EPP)

Utilice el EPP adecuado, incluidos guantes y mascarillas, durante la manipulación y administración de la medicación.

Referencias:

- World Health Organization (WHO). "Safe Injection and Medication Practices."
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). "Injection Safety."

NOTA: Los profesionales de anestesiología no podrán ingresar a las sedes (propias y en convenio) medicamentos que no sean solicitados mediante formato de solicitud de medicamentos o insumos por la bodega institucional de La Carolina Medical.

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	MODIFICACIÓN REALIZADA	FECHA DE APROBACION
1	Creación del documento	Mayo 30 de 2024